

PROSPECTO

Xylonor spray, solución

COMPOSICIÓN

Lidocaína base.....	5,40	g
Cetrimida.....	54,00	mg
Sacarina, aroma natural de menta, dipropilenglicol, alcohol a 95/ (V/V) c.s.p.	36,00	g

FORMA FARMACÉUTICA

Solución en frasco pulverizador

CONTENIDO

36 g

CATEGORÍA FARMACOTÉRAPÉUTICA

XYLONOR, spray es un medicamento de uso dental que asocia a su actividad principal, la anestesia de superficie, un efecto antiséptico.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA

COMERCIALIZADO POR

SEPTODONT

58, Rue du Pont de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés - Francia

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Insensibilización y desinfección de la mucosa antes de inyectar una solución anestésica local.
- Anestesia superficial para la avulsión de dientes de leche.
- Extracción de dientes que presenten una periodontitis avanzada.
- Anestesia antes de ajustar bandas de prótesis, bandas de ortodoncia, coronas, puentes.
- Supresión de reflejos en la toma de impresiones.
- Incisión y desbridamiento de abscesos superficiales.
- Ablación del sarro juxtagingival.

CONTRAINDICACIONES

- Reacciones alérgicas (muy raras) a los anestésicos locales de enlace amida.
- Hipersensibilidad conocida a la cetrimida (o a su clase química).

PRECAUCIONES DE EMPLEO

- No inyectar.
- No utilizar en el niño menor de 4 años (presencia de lidocaína).
- No sobrepasar la dosis máxima de 1,6 g de solución, o sea unas 20 pulsaciones para una anestesia. Ser prudente en caso de mucosa traumatizada, la reabsorción de la lidocaína podría ser más rápida y mayor.
- Hay que considerar un cierto riesgo de anestesiafagia: mordeduras diversas (labios, mejillas, mucosas, lengua).

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Ninguna señalada hasta la fecha.

ADVERTENCIAS ESPECIALES

- Producto reservado exclusivamente para el uso del especialista en odontoestomatología.
- No utilizar en el niño menor de 4 años (presencia de lidocaína)
- Se avisará a los deportistas que el anestésico contiene un principio activo que puede inducir una reacción positiva de las pruebas practicadas en los controles antidoping.

MUJERES EMBARAZADAS O DURANTE LA LACTANCIA

Ningún efecto señalado.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

- Cada pulverización libera unos 10 mg de lidocaína base. Se proyecta una gota de líquido que cubra una superficie de 1 cm aproximadamente.
En una sesión, se podrá repetir esta operación en 4 ó 5 sitios diferentes de la mucosa.
- No utilizar en el niño menor de 4 años.
- Retirar el capuchón colocado en la parte superior del envase y adaptar el difusor al tubo metálico apretando hasta el tope, dejar subir el difusor y apretar dos o tres veces verticalmente para purgar la cánula.
Colocar el extremo de la cánula a unos 2 cm de la zona que se desee anestesiarse y apretar sobre el difusor en el eje del recipiente.

Observación:

Una vez administrado el anestésico en la mucosa, es importante que el paciente elimine en la escupidera el exceso de producto para no ingerirlo.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones tóxicas (no repertoriadas para esta forma utilizada por vía local) pueden aparecer en dos condiciones: bien sea inmediatamente por sobredosis relativa debida a un paso intravenoso accidental, o más tarde por sobredosis real debida a la administración de una cantidad excesiva de anestésico.

Se puede observar en:

- El Sistema Nervioso Central: Nerviosismo, agitación, bostezos, temblores, aprensión, nistagmos, verborrea, cefaleas, náuseas, zumbidos de oídos.


Estos signos necesitan, en cuanto aparecen, un tratamiento de emergencia para evitar una posible agravación: convulsiones y depresión del S.N.C.

- El Sistema Respiratorio: taquipnea, luego dispnea.
- El Sistema Cardiovascular: taquicardia, hipertensión posiblemente seguidas de signos depresivos, hipotensión, bradicardia que pueden preceder al paro cardiaco.

CADUCIDAD

No utilizar el producto después de la fecha de caducidad que figura en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los

medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia o cualquier otro sistema de recogida de residuos de medicamentos. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN DEL PROSPECTO

07/04/2011

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.es/>