

# Néocônes, comprimidos para uso dental

## Composición cualitativa y cuantitativa

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| SULFATO DE NEOMICINA             |           |
| Cantidad correspondiente a ..... | 15,400 UI |
| BENZOCAÍNA .....                 | 5,00 mg   |
| Almidón de trigo .....           | 2,50 mg   |
| Lactosa monohidratada .....      | 10,50 mg  |
| Celulosa microcristalina .....   | 9,50 mg   |
| Estearato de magnesio .....      | 0,50 mg   |

Por un comprimido de 50 mg para uso dental

## Forma farmacéutica

Comprimido para uso dental.

## DATOS CLÍNICOS

### Indicaciones terapéuticas

Tratamiento complementario de la alveolitis luego del control y limpieza del alvéolo.

### Posología y modo de administración

Aplicación local estricta.

Tomar 1 ó 2 comprimidos del frasco de manera aséptica, luego colocarlo(s) en el alvéolo dentario después del control y la detersión del mismo.

En caso de inserción en un alvéolo muy pequeño, es posible cortar los comprimidos.

La forma de los comprimidos permite una presión fácil con una pinza.

### Contra-indicaciones

- Antecedentes de hipersensibilidad a la benzocaína (o de sensibilización a los anestésicos de tipo éster).
- Antecedentes de alergia a la neomicina y/o a los antibióticos del mismo grupo (aminoglucósidos).
- No utilizar en la dentadura primaria (niños de menos de 12 años).

### Advertencias y precauciones particulares de empleo

El producto debe ser utilizado con cuidado en el niño, en el cual puede provocar una metahemoglobinemia.

Interrogar al paciente para conocer los posibles antecedentes alérgicos.

Cuando el paciente ha sido tratado con neomicina durante el mes que precede a la extracción dental, evitar la aplicación del producto con el fin de paliar cualquier riesgo de resistencia eventual.

Esta especialidad contiene lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes. Aunque la cantidad presente en el preparado no es, probablemente, suficiente para desencadenar los síntomas de intolerancia, en caso que aparecieran diarreas debe consultar a su médico. Este producto contiene almidón de trigo; los enfermos celíacos deben consultar con su médico antes de utilizarlo.

Se advierte a los deportistas que esta especialidad contiene un principio activo que puede inducir una reacción positiva de los análisis efectuados durante los controles antidopaje.

## Reacciones adversas

- Riesgo de manifestaciones alérgicas con sensibilización de grupo cruzada con los derivados del ácido para-aminobenzoico (sulfamidas, ciertos anestésicos locales, conservadores, colorantes).
- Riesgo de alergia a la neomicina.

## PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

### Propiedades farmacodinámicas

PRODUCTO PROFESIONAL DENTAL  
(R02AB01 - Neomicina)

Neomicina : antibiótico de la familia de los aminoglucósidos de acción local.

Benzocaína : anestésico de acción local, que permite una analgesia que se instala al cabo de un minuto y dura de 15 a 20 minutos.

## DATOS FARMACÉUTICOS

### Periodo de conservación

2 años.

### Precauciones particulares de conservación

Consérvese a una temperatura inferior a 25°C, protegido de la luz y de la humedad.

### Naturaleza y contenido del recipiente

Frasco de vidrio amarillo (tipo III) de 31 ml (50 comprimidos) con espuma de poliuretano para la protección.

## PRESENTACIÓN Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

C.N. 854 927-6: 50 comprimidos para uso dental en frasco

## CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DE OTORGAMIENTO

Con receta ordinaria.  
MEDICAMENTO RESERVADO AL USO PROFESIONAL.

## TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

SEPTODONT  
58, Rue du Pont de Créteil  
94100 Saint Maur des Fossés  
Francia

## FECHA DE APROBACIÓN

SEPTODONT  
58, rue du Pont de Créteil.  
94100 Saint-Maur-des-Fossés, Francia.

